

# BRISTOLSKALA FOR AFFØRINGSTYPER

**MOVICOL®**  
macrogol 3350  
Aktivér maven naturligt

## TYPE 1

Separate hårde klumper der ligner nødder.



MOVICOL®  
DOSIS  
ØGES

## TYPE 2

Pølseform men med klumper.



MOVICOL®  
DOSIS  
ØGES

## TYPE 3

Ligner en pølse men med revner på ydersiden.



MOVICOL®  
DOSIS  
FASTHOLDES



## TYPE 4

Ligner en pølse eller orm, smidig og blød.



MOVICOL®  
DOSIS  
FASTHOLDES



## TYPE 5

Bløde klumper med skarpe kanter (let at få ud).



MOVICOL®  
DOSIS  
REDUCERES

## TYPE 6

Iturevne småstykker.



MOVICOL®  
DOSIS  
REDUCERES

## TYPE 7

Vandig uden klumper. Kun væske.



MOVICOL®  
DOSIS  
REDUCERES

**MOVICOL® og MOVICOL® Chokolade**, pulver til oral opløsning. **Virksomme stoffer:** Macrogol 3350, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, kaliumchlorid. **Indikation:** Behandling af kronisk obstipation og behandling af refraktær obstipation: Opløsning af retineret fæces i colon og/eller rectum verificeret ved lægeundersøgelse af abdomen og rectum. **Kontraindikationer:** Gastrointestinal obstruktion eller perforation som følge af strukturelle eller funktionelle forstyrrelser i tarmvæggen. Ileus. Akutte kirurgiske abdominale tilstande såsom akut appendicitis. Alvorlige betændelsestilstande i tarmene såsom Morbus Crohn og colitis ulcerosa med betydende sygdomsaktivitet. Toksisk megacolon. Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for ét eller flere af hjælpestofferne. **Særlige advarsler og forsigtighedsregler:** Væskeindholdet af MOVICOL®, når det er rekonstitueret med vand, erstatter ikke sædvanligt væskeindtag, og et passende væskeindtag bør opretholdes. Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. **Bivirkninger:** Meget almindelige: Mavesmerter, mavekramper, diarré, opkastning, kvalme, borborygmi, flatulens. Almindelige: Pruritus, hovedpine, perifert ødem. Ikke almindelige: Udslæt, dyspepsi, abdominal udspiling. Meget sjælden: Allergiske reaktioner, anorektal irritation. **Interaktioner:** Det er muligt at optagelsen af andre lægemidler kan være reduceret ved anvendelse af MOVICOL®. Der har været enkeltstående tilfælde med nedsat effekt af nogle lægemidler, f.eks. epilepsimidler, der blev givet samtidig. **Graviditet og amning:** Graviditet: Kan anvendes af gravide kvinder. Amning: Kan bruges i forbindelse med amning. **Dosering og indgivelsesmåde:** Kronisk forstoppelse: Voksne: 1-3 breve dagligt afhængigt af individuelt respons. En behandling varer normalt ikke længere end 2 uger, men kan gentages om nødvendigt. Svær forstoppelse: Voksne: 8 breve indtaget over 6 timer, opløst i 1 liter vand. Behandling varer normalt ikke længere end 3 dage. Patienter med nedsat hjertepumpefunktion: Ved behandling af svær forstoppelse bør dosis fordeles således, at der ikke gives mere end 2 breve inden for en time. **Administration:** Før anvendelse skal hver pose indhold opløses i 125 ml vand. **Børn:** Bør ikke anvendes til børn under 12 år. For yderligere oplysninger se [www.produktresume.dk](http://www.produktresume.dk) **Udlevering:** HF. **Tilskud:** Ikke tilskudsberettiget. **Pakninger:** MOVICOL® 8 stk., 20 stk., 50 stk. og 100 stk. MOVICOL® Chokolade: 20 stk. og 50 stk. **Priser:** Se [www.medicinpriser.dk](http://www.medicinpriser.dk). **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Norgine BV, Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, Holland. **Repræsentant:** : Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev. Produktinformationen er forkortet. Et fuldstændigt produktresumé fra 8. februar 2016 for MOVICOL® og 21. maj 2015 for MOVICOL® Chokolade kan rekvireres hos repræsentanten af markedsføringstilladelsen. NOR/MOV/0216/0067