


Bristolskala for Afføringstyper

MOVICOL®
macrogol 3350 med ektindtylter

Type 1



Separate, hårde klumper, som ligner nødder

**FORØG
MOVICOL®
DOSIS**

Type 2



Pølseformet med klumper

**FORØG
MOVICOL®
DOSIS**

Type 3



Ligner en pølse med revner på ydersiden

**FASTHOLD
MOVICOL®
DOSIS**



Type 4



Ligner en pølse, smidig og blød

**FASTHOLD
MOVICOL®
DOSIS**



Type 5



Bløde klumper med skarpe kanter (lette at få ud)

**REDUCER
MOVICOL®
DOSIS**

Type 6



Småstykker

**REDUCER
MOVICOL®
DOSIS**

Type 7



Vandig uden klumper
Kun væske

**REDUCER
MOVICOL®
DOSIS**



Læs altid indlægssedlen grundigt inden anvendelsen

MOVICOL®, MOVICOL® chokolade, pulver til oral opløsning, MOVICOL® GO, oral opløsning i brev. Macrogol 3350, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat, kaliumchlorid. Lægemiddel til behandling af kronisk forstoppelse og indeklemt afføring verificeret af en læge, fra 12 år. Dosis er 1-3 breve pr. dag. Brevene med pulver skal opløses i 125 ml vand. Ved svær forstoppelse: 8 breve indtaget over 6 timer, ved breve med pulver opløses de i 1 liter vand, ved MOVICOL® GO indtages der yderligere 1 liter vand pr. dag. Behandlingen varer normalt ikke længere end 3 dage. Anvend ikke MOVICOL® ved tarmperforation/obstruktion, tarmslyng, alvorlige betændelsestilstande i tarmene og toksisk megacolon. Årsagen til forstoppelsen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for MOVICOL®. MOVICOL® Chokolade indeholder benzylalkohol, som kan give allergiske reaktioner. Hyppigste bivirkninger er mavesmerter, mavekrampe, diarré, opkastning, kvalme, rumlen og luft i maven, hovedpine, kløe, ødem. Kan anvendes af gravide og ammende. Absorption af andre lægemidler kan være reduceret på grund af forkortet transitid gennem mave-tarm-kanalen. Pakninger: MOVICOL® 20 stk., 50 stk. og 100 stk. MOVICOL® Chokolade: 20 stk. og 50 stk. MOVICOL® GO: 10 stk. Priser: Se medicinpriser.dk. Norgine Danmark A/S, Kirsten Walthers Vej 8A. DK-2500 Valby. Baseret på SmPC af 13.12.2021. DK-GE-MOV-2100068 Dec 2021